



Objaśnienia symboli



ozdobne
liście



wysiew nasion
do gruntu



ozdobne
kwiaty



cebule do
wykopania



cebule zimujące
w gruncie



sadzenie
rozsady

Katalog



Agapant

Agapanthus

Rodzina: agapantowate (*Agapanthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 50-90 cm.

KWITNIENIE: VII-IX.

KWIATY: Białe lub niebieskie, zebrane w główkowate grona na wysokich szypułkach.

ORGANY PODZIEMNE: Grube kłącze z mięsistymi korzeniami. Może wymarzać. Zagony należy okryć na zimę ściółką lub kłącza wykopać i przechować w temp. 2-5°C przykryte torfem lub trocinami.

TERMIN SADZENIA: Wiosną po podziale kłączy (koniec IV-V).

ROZMNAŻANIE: Podział dużych kłączy.

STANOWISKO: Zacisne, słoneczne, gleba żyzna, wilgotna, ale nie podmokła. Należy obficie podlewać i nawozić.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Roślina efektowna w dużych jednorodnych grupach lub w pojemnikach.



Begonia bulwiasta

Begonia x tuberhybrida

Rodzina: ukośnicowate (*Begoniaceae*)

WYSOKOŚĆ: 25-35 cm, są też odmiany wiszące.

KWITNIENIE: V-X.

KWIATY: Różnobarwne, różnej wielkości, brzegi gładkie lub fryzowane.

ORGANY PODZIEMNE: Duża spłaszczona bulwa pokryta skórą. Należy je wykopywać i przechowywać w temp. 8-10°C.

TERMIN SADZENIA: III-IV do doniczek, po przymrozkach do gruntu lub pojemników.

ROZMNAŻANIE: Przez podział wiosną, II-III podział dużych kłączy lub siew nasion.

STANOWISKO: Półcieniste, zacisne i wilgotne. Doskonała roślina do pojemników, a odmiany wiszące – do skrzynek balkonowych o wystawie północnej.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Roślina wyjątkowo wartościowa i popularna dzięki długiemu kwitnieniu.



Błonczatka, ismena

Hymenocallis

Rodzina: amarylkowate (*Amarylidaceae*)

WYSOKOŚĆ: 35-40 cm.

KWITNIENIE: VII-VIII.

KWIATY: Białe, z oryginalnie powyginanymi wąskimi płatkami i dużym przykoronkiem, pachnące.

ORGANY PODZIEMNE: Duża cebula osłonięta suchą łuską.

Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C pod przykryciem z torfu lub trocin.

TERMIN SADZENIA: IV-V.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Słoneczne, zaciszne, gleba żyzna, wilgotna. Może być uprawiana w pojemnikach.



Cantedeskia kolorowa

Zantedeschia, mieszańce *Z. ellottiana*,
Z. rehmanii

Rodzina: obrazkowate (*Araceae*)

WYSOKOŚĆ: 60-100 cm.

KWITNIENIE: VII-VIII.

POCHWY KWIATOSTANOWE: Na wzniesionych szypułach, kielichowate, duże, różnobarwne.

ORGANY PODZIEMNE: Kuliste, spłaszczone kłącze. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 9-12°C.

TERMIN SADZENIA: IV-V.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie fragmentów kłącza przed sadzeniem.

STANOWISKO: W półcieniu, na żyznej, wilgotnej, dobrze zdrenowanej glebie. Komponuje się w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Dekoracyjne, nakrapiane liście.



Cebulica Tubergena

Scilla mischtsenkoana, syn. *S. tubergeniana*

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 10-15 cm.

KWITNIENIE: III.

KWIATY: Biało-niebieskie, dzwonkowate.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Ma niewielkie wymagania. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu na lekkiej glebie. Dobrze się prezentuje na skraju rabat, w pobliżu krzewów lub wokół niewielkich drzew. W sprzyjającym miejscu, np. na trawniku z rzadką trawą, tworzy efektowne kobierce.

GATUNKI: Cebulka syberyjska (*S. sibirica*) – kwiaty szafirowo-niebieskie.



Czosnek olbrzymi

Allium giganteum

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

WYSOKOŚĆ: 40-70 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Duże, dekoracyjne kuliste kwiatostany na długich szypułach. Pojedyncze kwiaty gwiazdkowate: białe, lila, niebieskie, purpurowe, fioletowe, żółte. Stosowane czasem na kwiaty cięte. Długo stoją w wazonie.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych lub siew nasion po ich dojrzeniu.

STANOWISKO: W pełnym słońcu na ciepłej, przepuszczalnej glebie. Niskie gatunki i odmiany efektownie wyglądają sadzone grupami na skalniakach, średnie na wielogatunkowych rabat, a najwyższe są idealne jako solitery.

GATUNKI: Niskie do 30 cm: czosnek karatawski (*A. karataviense*), czosnek neapolitański (*A. neapolitanum*), czosnek złocisty (*A. moly*); wysokie, 40-70 cm: czosnek Krzysztofa (*A. christophii*), *A. caeruleum*, czosnek główkowaty (*A. sphaerocephalon*), czosnek Szuberta (*A. schubertii*).



Czosnek sztyletowaty

Nectarosicordium sicculum

Rodzina: czosnkowate (*Alliaceae*)

WYSOKOŚĆ: 40-60 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Dzwonkowate, zielonkawo-purpurowe, zebrane w luźne kwiatostany; wydzielają słodki nektar.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: IX – pocz. X.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych, siew nasion po ich dojrzeniu.

STANOWISKO: W pełnym słońcu na cieplej, przepuszczalnej glebie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Efektowne na wielogatunkowych rabatach.



Dalia

Dahlia

Rodzina: astrowate (*Asteraceae*)

WYSOKOŚĆ: Od 30 cm (odmiany karłowe) do 120 cm.

KWITNIENIE: VII-IX.

KWIATY: Różnobarwne, różniące się budową (pojedyncze, półpełne, peoniowe, pomponowe, kaktusowe itp.). Dalia pomponowe i kaktusowe nadają się na kwiaty cięte.

ORGANY PODZIEMNE: Karpy z licznymi bulwiastymi korzeniami. Wymagają wykopywania i przechowywania w temp. 5-10°C, lekko przykryte piaskiem.

TERMIN SADZENIA: Pocz. V do gruntu lub wcześniej do doniczek.

ROZMNAŻANIE: Przez podział karp IV-V.

STANOWISKO: Słoneczne, gleba żyzna. Na słabym stanowisku wymaga nawożenia i podlewania. Odmiany karłowe idealnie się nadają do pojemników i na obwódki, niskie – na kwietniki, rabaty, do skrzynek i mis, a średniowysokie i wysokie – do tworzenia grup ogrodowych, osłon, na wyższe partie rabat.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Kruche pędy, szczególnie odmian wysokich, w czasie kwitnienia trzeba podwiązywać do palików.

C

D



Galtonia biaława, hiacynt letni

Galtonia candicans

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 1-1,2 m.

KWITNIENIE: VII-VIII.

KWIATY: Duże, białe, dzwonkowate, osadzone na długim, okazałym pędzie.

ORGANY PODZIEMNE: Duża cebula osłonięta suchą łuską.

Wymaga wykopywania i przechowywania w temp. 12-15°C.

TERMIN SADZENIA: IV.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych wczesną wiosną lub z nasion.

STANOWISKO: Słoneczne, gleba żyzna, wilgotna. Pięknie wygląda sadzona w dużych grupach na tle ciemnozielonych krzewów.



Hiacyncik hiszpański, endymion, cebulica hiszpańska

Hyacinthoides hispanica

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 30-40 cm.

KWITNIENIE: V-VI.

KWIATY: Fioletowoniebieskie, niebieskie, białe, różowe, dzwonkowate, zebrane po osiem-dziesięć w kłosowate grona.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, zimotrwała.

TERMIN SADZENIA: X-XI.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych.

STANOWISKO: Słoneczne lub półcieniste, ciepłe, gleba przepuszczalna i zasobna. Dobrze wygląda na wielogatunkowych rabatach. Nadaje się na kwiaty cięte.



Hiacynt

Hyacinthus orientalis

Rodzina: hiacyntowate (*Hyacinthaceae*)

WYSOKOŚĆ: 25-30 cm.

KWITNIENIE: IV-V.

KWIATY: W różnych kolorach oprócz czerwonego, intensywnie pachnące. Kwiatostan to krótkie grono.

ORGANY PODZIEMNE: Cebula osłonięta suchą łuską, jasną lub bordową.

TERMIN SADZENIA: IX.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie cebul przybyszowych, nacinanie piętki.

STANOWISKO: Gleba ciepła, przepuszczalna, żyzna. Wskazane coroczne wykopywanie cebul.



Jaskier azjatycki

Ranunculus asiaticus

Rodzina: jaskrowate (*Ranunculaceae*)

WYSOKOŚĆ: 25-25 cm.

KWITNIENIE: VI-VII.

KWIATY: Miseczkowate, często półpełne lub pełne. Płatki błyszczące: białe, żółte, różowe, osadzone na szczytach pędów.

ORGANY PODZIEMNE: Bulwiaste małe kłącza (wysuszone przypominają pazurki). Przed sadzeniem należy je moczyć w wodzie. Po kwitnieniu kłącza należy wykopać i przechowywać w temp. 8-10°C.

TERMIN SADZENIA: IV.

ROZMNAŻANIE: Oddzielanie małych kłączy wiosną lub z nasion.

STANOWISKO: W pełnym słońcu, na glebie żyznej, przepuszczalnej. Po kwitnieniu ograniczyć podlewanie.

H

J